

Культура	Ознаки дефіциту кальцію	Наслідки	Фаза внесення	Фоліарно	Кропельне зрошення / фертигація
Пшениця, ячмінь	Слабкі молоді листки, пригнічення росту	Зниження кущення та врожайності	2–4 листки / кущення	1,8–2,5 л/га	2–3 л/га
Кукурудза	Скручування молодих листків, слабе коріння	Пригнічення росту, недорозвинений качан	5–8 листків	2–3 л/га	3–4 л/га
Соняшник	Слабкий розвиток кошика	Недолив насіння	4–8 листків	2–3 л/га	3–4 л/га
Ріпак	Відмирання точки росту	Погана перезимівля та гілкування	Розетка – бутонізація	2–3 л/га	3–4 л/га
Соя, горох	Опадання квіток і зав'язі	Зниження кількості бобів	Бутонізація – цвітіння	2 л/га	2–3 л/га
Цукровий буряк	Некроз молодих листків	Втрата цукристості	Змикання рядків	2 л/га	3–5 л/га
Картопля	Потемніння м'якоті, слабка шкірка	Погане зберігання бульб	Початок бульбоутворення	2–4 л/га	3–5 л/га
Томати	Вершинна гниль плодів	Втрата товарності	Перед цвітінням – налив плодів	2–3 л/га	3–4 л/га
Перець	Внутрішній некроз плодів	Деформація плодів	Цвітіння – формування плодів	2–3 л/га	3–4 л/га
Огірки, гарбузові	Викривлення плодів, слабка шкірка	Розтріскування та низька лежкість	Перед цвітінням – плодоношення	2–3 л/га	3–4 л/га
Цибуля, часник	М'яка шийка	Погане зберігання	Формування цибулини	2–4 л/га	3–5 л/га
Полуниця	М'які ягоди, водянистість	Низька транспортабельність	Бутонізація – плодоношення	2–3 л/га	2–3 л/га

Культура	Ознаки дефіциту кальцію	Наслідки	Фаза внесення	Фоліарно	Кропельне зрошення / фертигація
Виноград	Розтріскування ягід	Втрати врожаю та гнилі	4–8 листків – налив ягоди	2 л/га	4–6 л/га
Яблуня	Гірка ямковість (Bitter Pit)	Втрати при зберіганні	Після цвітіння – ріст плодів	2 л/га	5–8 л/га
Груша	Підшкірний некроз	Плямистість плодів	Формування плодів	2 л/га	5–8 л/га
Черешня, вишня	Тонка шкірка плодів	Масове розтріскування	Після цвітіння	2 л/га	4–6 л/га
Персик, слива	М'яка тканина плодів	Зниження лежкості	Формування плодів	2 л/га	4–6 л/га
Капуста	Внутрішній некроз листка	Загнивання качана	Формування качана	1–2 л/га	3–5 л/га
Салати, листові овочі	Тір Burn (крайовий опік)	Непридатність до реалізації	Формування розетки	1–2 л/га	2–4 л/га
Морква, буряк	Розтріскування коренеплодів	Втрата товарності	Активний ріст коренеплоду	2 л/га	3–4 л/га
Баштанні	Слабка шкірка плодів	Деформація та тріщини	Цвітіння – налив плодів	2–3 л/га	3–4 л/га
Лохина, малина	М'яка ягода	Погана транспортабельність	Перед цвітінням – налив ягоди	2 л/га	3–5 л/га
Люцерна, конюшина	Повільне відновлення	Зниження маси укошу	5–10 см відростання	4 л/га	4–5 л/га
Декоративні культури	Хлороз молодих тканин	Ослаблення рослин	Активний ріст	1–2 л/га	2–3 л/га
Тепличні культури	Вершинна гниль, Тір Burn	Швидка втрата якості	Весь період вегетації	20–30 мл/10 л	0,5–1 л/1000 м²